

# 3 variétés inscrites en 2007

## Long A : SIRBAL

Obtention : CFR-CIRAD



- Très bonne implantation,
- Bon tallage,
- Précocité identique à Ariète,
- Paille plus courte que celle d'Ariète,
- Bonne résistance à la pyrale et au sclérotium.

Qualité technologique : classe Ariète

	2005		2006		Moyenne		% du témoin
	Nombre d'essais retenus	q/ha	Nombre d'essais retenus	q/ha	Nombre d'essais retenus	q/ha	
Ariète	6	58,56	6	68,25	12	63,78	
Sirbal	6	61,71	6	74,88	12	68,80	107,87

Source : GEVES-CTPS

# Long B : ADRET

Obtention CFR-CIRAD



- Demi précoce,
- 107 % du rendement du témoin Thaïbonnet,
- Bonne implantation et bon tallage,
- Paille courte,
- Bonne résistance à la pyrale et au sclérotium.

Qualité technologique : profil Thaïbonnet/Eolo ;  
amylose 24 %

# Long B : BARCARIN

Obtention CFR-CIRAD



- Demi tardif,
- 115 % du rendement du témoin Thaïbonnet,
- Bonne implantation et bon tallage,
- Paille très courte,
- Bonne résistance à la pyrale et au sclérotium.

Qualité technologique : profil Thaïbonnet/Eolo ; amylose 24 %

	2005		2006		Moyenne		% du témoin
	Nombre d'essais retenus	q/ha	Nombre d'essais retenus	q/ha	Nombre d'essais retenus	q/ha	
Thaïbonnet	6	48,74	6	64,76	12	57,37	
Ruille	6	61,23	6	72,45	12	67,27	117,25
Adret	6	51,24	6	70,12	12	61,41	107,04
Barcarin	6	53,69	6	76,22	12	66,83	114,75

Source : GEVES-CTPS